Étiquette Supplémentaire

ÉTIQUETTE SUPPLÉMENTAIRE POUR UTILISATION D'URGENCE D'ADMIRE 240F POUR SUPPRIMER LES PUCERONS DU FRAISIER SUR LES FRAISIERS CULTIVÉS EN COLUMBIE-BRITANNIQUE JUSQU'AU 31 AOÛT 2006

ADMIRE®

240 INSECTICIDE SYSTÉMIQUE EN SUSPENSION AQUEUSE

GROUPE	4	INSECTICIDE

USAGE AGRICOLE

GARANTIE : Imidaclopride ..... 240 g/L

NUMÉRO D'HOMOLOGATION : 24094 – LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION POISON

BIEN SECOUER AVANT L'EMPLOI

CONTENU NET : 1 litre, 3,785 litres

Renseignements sur le produit : 1-888-283-6847

Bayer CropScience Inc.
100 – 3131 114th Avenue SE
Calgary, Alberta T2Z 3X2

En cas de déversement, d'empoisonnement ou d'incendie, appeler au numéro d'urgence suivant : 1-800-334-7577 (24 heures par jour).

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la *LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES*.
AVIS À L'ACHETEUR : La garantie accordée par le vendeur se limite aux conditions énoncées sur l'étiquette et, sous cette réserve, l'acheteur assume les risques corporels ou matériels découlant de l'utilisation ou de la manipulation du produit, et accepte celui-ci à cette condition.

MODE D'EMPLOI

Lire l'ÉTIQUETTE, LA BROCHURE AINSI QUE CETTE ÉTIQUETTE SUPPLÉMENTAIRE POUR UTILISATION D'URGENCE avant l'emploi.
NE PAS APPLIQUER PAR épandage aérien.
Lire tout le MODE D'EMPLOI avant d'utiliser l'Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 F.
Ne pas appliquer lorsque le vent souffle à plus de 12 à 15 km à l'heure.
Ne pas appliquer de produit de 15 mètres d'une tête de puits ou de systèmes aquatiques, y compris marais, étangs, fossés, ruisseaux, lacs, etc.
Ne pas appliquer sur les terrains présentant un risque de ruissellement vers les systèmes aquatiques.
Ne pas appliquer de produit lorsqu'il y a risque d'averse dans les 48 heures.
Ne pas préparer la bouillie, ni remplir ou nettoyer l'équipement de pulvérisation à moins de 30 mètres d'une tête de puits ou de systèmes aquatiques.
Ne pas appliquer ce produit à l'aide d'un système d'irrigation de quelque type que ce soit.
Ce produit chimique possède les propriétés et les caractéristiques associées aux produits chimiques décelés dans l'eau souterraine. L'utilisation de l'Insecticide ADMIRE 240 F aux endroits où les sols sont perméables, surtout là où la nappe phréatique est peu profonde, risque de contaminer l'eau souterraine.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE
Pour préparer la bouillie à pulvériser, verser une partie de l'eau nécessaire dans le réservoir et, en agitant, verser l'Insecticide ADMIRE 240 F à dispersion aqueuse. Remplir ensuite le réservoir avec le reste de l'eau nécessaire. La bouillie doit être constamment agitée pendant le mélange et l'application.

CULTURES DE ROTATION
Veuillez consulter toute la brochure pour connaître les recommandations en matière de plantation. L'imidaclopride est rémanent et comporte des risques élevés d'effet résiduel; il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit dans les champs traités avec l'Insecticide ADMIRE 240 F pendant la saison précédente.

RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE
Veuillez consulter toute la brochure pour connaître les recommandations en matière de gestion de la résistance.

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE GESTION DE LA DÉRIVE DE PULVÉRISATION
Veuillez consulter toute la brochure pour connaître les recommandations en matière de gestion de la dérive de pulvérisation.

APPLICATION SUR LES FRAISIERS

L'Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 peut être utilisé pour supprimer les pucerons du fraisier sur les fraisiers cultivés en Colombie-Britannique

APPLICATIONS RECOMMANDÉES – FRAISIERS			
CULTURE	INSECTE	DOSE d'ADMIRE 240 F	REMARQUES
Fraisiers	Puceron du fraisier	Application au sol 850 ml – 1,3 L/ha	APPLICATION AU SOL SEULEMENT • Appliquer sur les plantations établies de fraisiers. • Appliquer la dose spécifiée de l'insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 lorsque le croissance est commencée au printemps. • Les populations de pucerons peuvent être très faibles, mais le traitement est nécessaire avant la formation et la dispersion des pucerons ailés. • Ne pas appliquer pendant la floraison. • Appliquer la dose spécifiée dans 2000 L d'eau à l'hectare en application directe sur le rang. L'application devrait être faite avec suffisamment d'eau pur s'assurer une incorporation jusque dans la zone racinaire. • La quantité de produit appliquée a un effet sur la durée de la suppression. Utiliser les doses les plus élevées aux endroits où les infestations peuvent survenir tardivement dans le développement de la culture ou aux endroits où la pression du ravageur est continuelle. • N'appliquer qu'une seule fois par saison. • Ne pas appliquer lorsque des averses abondantes sont prévues dans les 48 heures. • Attendre au moins 30 jours entre la dernière application d'Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240 et la récolte. • Inspecter souvent les champs de fraisiers, surtout durant la période la plus chaude de la saison. Si les populations de pucerons du fraisier dépassent les seuils établis par les spécialistes de la région, appliquer un insecticide foliaire recommandé affichant un mode d'action différent de celui de l'Insecticide systémique en suspension aqueuse ADMIRE 240.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Nocif en cas d'ingestion ou d'absorption cutanée. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.
Les applicateurs et autres manipulateurs doivent porter ce qui suit :

- Chemise à manches longues et pantalon
- Gants imperméables
- Chaussures et chaussettes

Suivre les directives du fabricant pour le nettoyage et l'entretien de l'équipement de protection individuelle (EPI). À défaut de directives précises pour le matériel lavable, utiliser un détergent et de l'eau chaude. Laver et ranger l'EPI séparément des autres vêtements.
Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou d'aller aux toilettes. Si l'insecticide pénètre à l'intérieur des vêtements, retirer ces derniers immédiatement. Bien se laver et remettre des vêtements propres.
Retirer l'équipement de protection individuelle immédiatement après la manipulation de ce produit. Laver l'extérieur des gants avant de les retirer. Dès que possible, bien se laver et remettre des vêtements propres.
NOTE : Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, appelez au numéro 1-866-375-4648 ou consultez le site Internet www.cropro.org/.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Empêcher tout contact avec les lacs, les ruisseaux, les étangs et tout autre système aquatique. Ne pas contaminer les plans d'eau au moment de l'élimination des eaux de rinçage de l'équipement. Ce produit est très toxique pour les abeilles exposées directement au produit ou aux résidus sur les cultures et les mauvaises herbes en fleurs. Ne pas appliquer ce produit ni le laisser dériver sur les cultures ou les mauvaises herbes en fleurs si des abeilles butinent dans les secteurs à traiter. Ce produit est très toxique pour les invertébrés aquatiques. Ce produit est toxique pour les oiseaux. Appliquer ce produit conformément au mode d'emploi sur l'étiquette.

PREMIERS SOINS
EN CAS D'INGESTION : Communiquer avec un centre antipoison ou avec un médecin IMMÉDIATEMENT. Faire boire un ou deux verres d'eau et provoquer le vomissement en insérant un doigt dans le fond de la gorge de la personne incommodée ou en lui donnant du sirop d'ipéca, si on en a sous la main. Le cas échéant, donner 15 mL (une cuillerée à table) de sirop d'ipéca, suivie d'un ou de deux verres d'eau. Si la personne ne vomit pas dans les 20 minutes qui suivent, donner une deuxième dose de sirop. Ne pas provoquer le vomissement ni faire avaler quoi que ce soit à une personne inconsciente. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Bien laver avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation, obtenir des soins médicaux ou communiquer avec un centre antipoison IMMÉDIATEMENT. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Tenir les paupières ouvertes et rincer à grande eau pendant 15 minutes. En cas d'irritation, obtenir des soins médicaux ou communiquer avec un centre antipoison IMMÉDIATEMENT.
Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Il n'existe aucun antidote spécifique. Traiter le patient selon les symptômes.
ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais et sec, de façon à éviter la contamination croisée avec d'autres pesticides et engrais ou avec la nourriture de consommation humaine ou animale. Entreposer dans le contenant d'origine, hors de la portée des enfants, de préférence dans un endroit fermé à clé.
ÉLIMINATION : Faire en sorte de ne pas contaminer l'eau et la nourriture de consommation humaine ou animale en entreposant ou en éliminant le produit.

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial.
S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

060316A

®ADMIRE est une marque déposée de Bayer.